

	AMISTAR*	CASINO	DOMINO*	FUNKY	JOKER
Nombre de rangs	6	6	6	6	6
Caractéristiques agronomiques					
Alternativité	5	5	4	4	5
Hauteur de plante	5	5	5,5	5	5
Précocité montaison	½ précoce	½ précoce	½ précoce	½ précoce	½ précoce
Précocité épiaison	7	7	6,5	6,5	6,5
Précocité maturité	précoce	précoce	½ précoce à précoce	½ précoce à précoce	½ précoce
Résistance au froid	3	6	5,5	6,5	4,5
Résistance verse	5,5	5	5,5	6,5	6,5
Mosaïque (Y1)	résistante	résistante	résistante	résistante	résistante (Y1 et Y2)
Tolérance maladies					
Rouille naine	4	5	7	6	6
Oïdium	3	5	6	6	7
Rhynchosporiose	6	4	7	6	7
Helminthosporiose	6	6	6	6	6
Caractéristiques technologiques					
Classe technologique	B	B	F	F	F
Poids spécifique	7	7	6	6	4
Teneur Protéines	4,5	4	4	4,5	4
Calibrage > 2.5 mm	8	8	7,5	7	7,5
PMG	4	4	6	5	4
Extrait	7,5	7,5	-	-	-

1 = très hiver – très tardif – très court – très sensible – très faible

9 = alternatif – très précoce – très haut – résistant - très élevé

B = à orientation brassicole F = fourragère

* = variété tolérante à la jaunisse nanisante de l'orge

	KWS AKKORD	KWS ORBIT	KWS MERIDIAN	KWS TONIC
Nombre de rangs	6	6	6	6
Caractéristiques agronomiques				
Alternativité	4	5	5	4
Hauteur de plante	5,5	5	5,5	5,5
Précocité montaison	½ tardive	½ précoce	½ précoce	½ précoce
Précocité épiaison	6,5	6,5	6	6,5
Précocité maturité	½ précoce	½ précoce	½ précoce	½ précoce
Résistance au froid	6,5	6,5	6,5	5
Résistance verse	5,5	6,5	6	6,5
Mosaïque (Y1)	résistante	résistante	résistante	résistante
Tolérance maladies				
Rouille naine	5	6	7	6
Oïdium	7	6	8	7
Rhynchosporiose	6	5	7	6
Helminthosporiose	7	6	6	6
Caractéristiques technologiques				
Classe technologique	F	F	F	F
Poids spécifique	5	6	5	5
Teneur Protéines	4	4	4	4
Calibrage > 2.5 mm	7,5	8	7,5	8
PMG	6	7	6	7
Extrait	-	-	-	-

1 = très hiver – très tardif – très court – très sensible – très faible

9 = alternatif – très précoce – très haut – résistant - très élevé

B = à orientation brassicole F = fourragère

* = variété tolérante à la jaunisse nanisante de l'orge